

BIPERIDENO

PRESENTACIONES HABITUALES

Ampolla 5mg/1mL

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

Síndromes extrapiramidales agudos por neurolépticos, antieméticos, butirofenonas y antihistamínicos

POSOLOGÍA ADULTOS

5mg IV muy lenta o IM. Se puede repetir a los 30 min. Dosis máxima diaria de 20 mg.

POSOLOGÍA NIÑOS

0,04-0,1 mg/kg IV lenta (en 15 min) o IM. Se puede repetir a los 30 min. Dosis máxima 5 mg.

OBSERVACIONES

Un exceso de dosis podría inducir un síndrome anticolinérgico.

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD)

20 mg = 4 ampollas

DISPONIBILIDAD HOSPITALES

- **Nivel A:** 4 ampollas
- **Nivel B:** 12 ampollas

BIBLIOGRAFÍA

1. Clerigué N, Herranz N. Antídotos y otros tratamientos en intoxicaciones pediátricas. En: Mintegi S. Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Madrid: Manual de Intoxicaciones de Pediatría. 3ª ed; 2012. Pp405-54
2. Hazardous Substance Data Bank (HSDB). TOXNET Toxicology Data Network. US National Library of Medicine (Consultado 14 abril 2015) Disponible en: <http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm>.

