

CARNITINA

PRESENTACIONES HABITUALES

Ampolla 1g/5mL

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

Valproico (FFT).



POSOLOGÍA ADULTOS

100mg /kg IV (dosis máxima 6g) en 30 min seguida de 15 mg/kg IV cada 4h (máx. 3g por dosis).

POSOLOGÍA NIÑOS

Misma pauta que adultos.

OBSERVACIONES

Continuar hasta disminuir amonio o mejora clínica

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD)

13 g = 13 ampollas

DISPONIBILIDAD HOSPITALES

- **Nivel A:** -
- **Nivel B:** 39 ampollas

BIBLIOGRAFÍA

1. Hazardous Substance Data Bank (HSDB). TOXNET Toxicology Data Network. US National Library of Medicine (Consultado 14 abril 2015) Disponible en: <http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm>.
2. Steven Bird, MD, FACEP. Organophosphate and carbamate poisoning. Literature review current through: Jan 2015. Base de datos UpToDate [consulta: 25 febrero 2015].
3. Josef T Prchal, MD. Clinical features, diagnosis, and treatment of methemoglobinemia. Literature review current through: Jan 2015. This topic last updated: Feb 05, 2015. Base de datos UpToDate [consulta 25 febrero 2015].