

D-PENICILAMINA

PRESENTACIONES HABITUALES

Cápsulas 250 mg

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

Metales pesados (plomo, arsénico, mercurio, cobre).



POSOLOGÍA ADULTOS

250 mg cada 6h (máx. de 1 g/día). Duración del tratamiento 2-3 semanas.

POSOLOGÍA NIÑOS

20-30 mg/kg/día en 3-4 dosis, (máx. de 1 g/día). Se puede iniciar con dosis más bajas (25% de la final) e ir aumentando.

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD)

13 g = 13 ampollas

DISPONIBILIDAD HOSPITALES

- **Nivel A:** -
- **Nivel B:** 12 cápsulas

BIBLIOGRAFÍA

1. Kearney TE. Penicillamine. In: Olson KR. Poisoning and drug overdose. 5th ed. New York: McGraw-Hill.2007:940-2.
2. Cupripen®. prospecto del medicamento.A partir de página del laboratorio: <http://www.laboratoriosrubio.com/es/productos/e-farmaceuticas/cupripen> [consulta 28 noviembre 2014].
3. Augusto V Ramírez. Intoxicación ocupacional por mercurio. An Fac med. 2008; 69(1):46-51.].