

DANTROLENO

PRESENTACIONES HABITUALES

Vial 20 mg (ME)

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

Hipertermia maligna.

POSOLOGÍA ADULTOS

2,5 mg/kg IV directa. Se puede repetir una dosis entre 2 y 3 mg/kg IV cada 15 min hasta controlar los síntomas o alcanzar la dosis máxima de 10 mg/kg. Durante las siguientes 24h, se recomienda 1 mg/Kg cada 6 h.

POSOLOGÍA NIÑOS

1-2,5 mg/kg IV directa. Repetir hasta el control de síntomas o alcanzar la dosis máxima de 10 mg/kg

OBSERVACIONES

1 g Reconstituir cada vial con 60 ml de API. Agitar hasta completa disolución. La solución reconstituida es estable 6 h a temperatura ambiente y protegida de la luz. La dosis total se traspasa a una bolsa de perfusión (nunca a envase de vidrio por riesgo de precipitación). Algunos lotes de dantroleno traen filtros para que la solución reconstituida sea filtrada cuando se traspasa al recipiente final (bolsa de perfusión). Cada vial contiene 3g de manitol.

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD)

700 mg = 35 viales

DISPONIBILIDAD HOSPITALES

- **Nivel A:** 35 viales
- **Nivel B:** 70 viales

BIBLIOGRAFÍA

1. Kenneth M. Dantrolen sodium. In: Nelson L, , Lewin NA, Howland MA, Hoffman RS, Goldfrank LR, Flomenbaum NE, editors. *Goldfrank's toxicologic emergencies*. 9th ed. Stamford (CT): McGraw Hill, New York 2011; 1001-1002
2. Dantrium®. Ficha técnica del medicamento. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales. Disponible en: <https://mse.aemps.es/mse>. [consulta 28 noviembre 2014].

