

FITOMENADIONA (VITAMINA K)

PRESENTACIONES HABITUALES

Ampolla 10 mg/1mL



INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

Anticoagulantes cumarínicos: warfarina y acenocumarol. Rodenticidas cumarínicos.

POSOLOGÍA ADULTOS

10 mg en 100 mL SF/SG5%.

POSOLOGÍA NIÑOS

5-10 mg vía oral si < 12 años, 5-25mg si >12 años. Si sangrado grave administrar IV 1-5mg/día (diluir en SF o SG5% y administrar lenta).

OBSERVACIONES

Si no hay sangrado, la fitomenadiona puede administrarse por vía oral. No utilizar nunca la vía IM. Controlar el INR.

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD)

40 mg = 4 ampollas

DISPONIBILIDAD HOSPITALES

- **Nivel A:** 4 ampollas
- **Nivel B:** 12 ampollas

BIBLIOGRAFÍA

1. Hazardous Substance Data Bank (HSDB). TOXNET Toxicology Data Network. US National Library of Medicine (Consultado 14 abril 2015) Disponible en: <http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm>.
2. Kearney TE, Vitamin K (Phytonadione). In: Olson KR. Poisoning and drug overdose. 5th ed. New York: McGraw-Hill.2007: 993-5.