

FLUMAZENILO

PRESENTACIONES HABITUALES

Ampolla 1mg/10 mL y 0,5 mg/5 mL.

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

Benzodiazepinas.

POSOLOGÍA ADULTOS

0,25 mg IV directa en 1 min. Repetir la dosis en 1 min si no respuesta hasta un máx. de 1 mg (4 bolus). Si revierte el coma pero reaparece somnolencia: 2 mg en 500 mL SG5% durante 6 h.

POSOLOGÍA NIÑOS

0,01 mg/kg IV directa en 30 segundos (máx. 0,2mg). Se puede repetir cada min hasta 1-2 mg. En infusión continua: 5-10 µg/kg/h.

OBSERVACIONES

Es compatible con SG 5%, SF y Ringer lactato.

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD)

10 mg.

DISPONIBILIDAD HOSPITALES

Presentación 1 mg/10 mL:

- **Nivel A:** 10 ampollas
- **Nivel B:** 30 ampollas

BIBLIOGRAFÍA

1. Clerigué N, Herranz N. Antídotos y otros tratamientos en intoxicaciones pediátricas. En: Mintegi S. Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Madrid: Manual de Intoxicaciones de Pediatría. 3ª ed; 2012. Pp405-54.
2. Hazardous Substance Data Bank (HSDB). TOXNET Toxicology Data Network. US National Library of Medicine (Consultado 14 abril 2015) Disponible en: <http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm>.

