

PROTAMINA SULFATO

PRESENTACIONES HABITUALES

Vial 50 mg/5 mL

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

Heparina sódica.

POSOLOGÍA ADULTOS

Si < 15 min: 1 mg (0,1mL) por 100UI de heparina sódica a neutralizar. Si > 15 min: 0,5 mg por 100 UI de heparina sódica a neutralizar. Max 50 mg por dosis. Velocidad de administración \leq 5mg/min.

En intoxicaciones por HBPM, si ha pasado menos de una semivida de la HBPM: 1 mg (0,1mL) por 100UI d'HBPM a neutralizar. Si más de una semivida: 0,5 mg (0,05 mL) por 100UI d'HBPM a neutralizar, dividiendo en dos la dosis calculada de protamina y administrar en inyecciones intermitentes o en perfusión continua.

POSOLOGÍA NIÑOS

Misma pauta que en adultos.

OBSERVACIONES

Se administra en forma de inyección intravenosa lenta, a una velocidad \leq 5 mg/min.

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD)

50 mg = 1 vial

DISPONIBILIDAD HOSPITALES

- **Nivel A:** 1 vial
- **Nivel B:** 3 viales

BIBLIOGRAFÍA

1. Hazardous Substance Data Bank (HSDB). TOXNET Toxicology Data Network. US National Library of Medicine (Consultado 14 abril 2015) Disponible en: <http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm>.
2. Protamina Hospira®. Ficha técnica del medicamento. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Disponible en: <http://www.aemps.gob.es> [consulta 28 noviembre 2014].

