

SUERO ANTIOFÍDICO

PRESENTACIONES HABITUALES

Vial 4mL (ME, Viperfav®).

Vial 100 UI/5ml (ME, Snake Venom Antiserum®).

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

Mordeduras de víboras.

POSOLOGÍA ADULTOS

-Viperfav: Perfusión IV de 4 mL de suero (1 vial) en 100 ml SF a 50 ml/h.

-Snake Venom Antiserum: 100UI (5ml) vía SC, seguidos de una segunda dosis IM en el glúteo. Podrían ser necesarias 1,2 o más dosis IM dependiendo del estado del paciente y en el segundo y tercer día 1 o 2 dosis más.

POSOLOGÍA NIÑOS

Misma pauta que en adultos.

OBSERVACIONES

Viperfav® presenta bajo riesgo de reacciones anafilácticas. Por el contrario, en el caso de Snake Venom Antiserum® se recomienda realizar test de hipersensibilidad previo a su administración.

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD)

-Viperfav: 1 vial

-Snake Venom Antiserum: 2 viales

DISPONIBILIDAD HOSPITALES

-Viperfav:

- **Nivel A:** 1 vial (si comarcal aislado y zona endémica).
- **Nivel B:** 2 viales

-Snake Venom Antiserum:

- **Nivel A:** 2 viales (si comarcal aislado y zona endémica).
- **Nivel B:** 4 viales



SUERO ANTIOFÍDICO

BIBLIOGRAFÍA

1. Amate Blanco JM, Bouza Álvarez, Conde Espejo P, Chippaux JP, De Haro L, Pino Luengo M et al. Intoxicaciones por mordeduras de ofidios venenosos (I panel de expertos en España). Informe Público de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 2012.
2. Viperfav®. Ficha técnica del medicamento. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales. Disponible en: <https://mse.aemps.es/mse>. [consulta 28 noviembre 2014].