

# URIDINA TRIACETATO

## PRESENTACIONES HABITUALES

**Sobres de 10 g, caja de 20 sobres (ME)**

## INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

Intoxicación por 5-FU o capecitabina.

## POSOLOGÍA ADULTOS

10 g (1 sobre) vía oral cada 6 horas, 20 dosis.

## POSOLOGÍA NIÑOS

6,2 g/m<sup>2</sup> (máx. 10 mg) vía oral cada 6 horas, 20 dosis.

## OBSERVACIONES

### Solicitud del medicamento

- Solicitud de importación a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

- Pasos a seguir para adquirir Vistogard con urgencia (instrucciones proporcionadas por la Agencia): Los centros deben realizar sus pedidos de Vistogard utilizando la línea telefónica de emergencia especializada WEP Clinical (+44 207 887 2235). Esta línea opera las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año. El primer mensaje se transmitirá en inglés y luego en los demás idiomas. Cuando escuchen el mensaje en castellano, deben seguir las instrucciones proporcionadas hasta que la llamada sea reenviada a uno de sus agentes especializados que atenderán al centro en su respectivo idioma. Todo el proceso se llevará a cabo por este medio. Cuando el pedido es realizado a través de esta línea, el envío del producto se puede llevar a cabo una vez finalizado el proceso telefónico, independientemente de la hora en que se realizó el pedido, es decir, el pedido se envía de inmediato. Cualquier otra comunicación con respecto a Vistogard puede realizarse también utilizando la dirección de correo electrónico específico para Vistogard (vistogard@wepclinical.com).

### Administración

Administrar con o sin alimentos.

## BIBLIOGRAFÍA

1. Vistogard®. Ficha técnica del medicamento. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales. Disponible en: <https://mse.aemps.es/mse>. [consulta enero 2020].

